

10


모돈의 체평점(BCS : Body Condition Score) 관리와 실시 요령에 대하여 알고 싶습니다.



모돈 체평점 실시 요령

체평점에 의한 개체관리는 차기 분만성적 저하를 방지하는 사양기술로서 체평점 판정 기준은 모돈 엉치부위 관골돌기의 지방 축적 상태를 손으로 만져서 비만도를 판정합니다. 번식모돈이 분만에 입식될 때 체평점을 실시하고, 분만 후 약 4~5일경 다시 점검한 다음 2일 간격으로 이유 시까지 실시하되, 임신기간 중에는 1주일에 1회 정도가 바람직합니다.

모돈의 체형점수 측정과 체형점수에 따른 상태



체형점수	상태	요각의 촉진	등지방두께
5	과비	손으로 관골돌기를 찾지 못함	25mm 이상
4	살져 있음	손으로 관골돌기를 찾지 못함	21mm
3.5	약간 살져 있음	관골돌기를 찾기 어려움	-
3	이상적	관골돌기를 손으로 쉽게 찾을 수 있음	18mm
2.5	약간 마름	관골돌기가 촉진되고 눈으로 볼 수 있음	-
2	너무 마름	너무 야위고 관골돌기를 눈으로 쉽게 볼 수 있음	10~15mm
1	심각하게 마름	체중 손실이 심각하여 매우 마른 상태	10mm 이하

출처 : 양돈과 영양-김유용, 2011

체평점에 의한 사료 급여 요령

이유 시에는 기준 평점인 2.5점을 목표로 사료 급여량을 적절히 증감해 주고, 임신 후기 직전인 임신 90일령에는 체평점이 3.0점이 되도록 이유 시 체평점 점수에 따라 사료를 증감해 줍니다. 갑작스러운 사료의 변경은 내분비 호르몬 균형이 깨질 염려가 있으므로 1차 조정 시 0.5kg씩 서서히 증감토록 합니다.