

13

청보리 품종과 재배 특성에 대해서 알려주세요.



■ 청보리 재배 특성

- 일반적인 생육적온은 4~20℃, 강수량은 1,000mm 지대에 잘 적응하는 작물이다.
- 토양은 양토 또는 식양토가 알맞으며, 배수가 불량한 논은 배수로를 설치한다.
- 호밀보다 초장이 짧고, 출수기 전후의 초기 생산량이 적다.
- 건물과 TDN 수량이 호밀과 대등하고, 에너지 함량은 높다.
- 추위에는 호밀보다 약하다.



선우보리



상원보리



영양보리

〈 청보리 품종의 생산성 및 특성 비교 〉

◆ 청보리의 국내 육성 품종('21년 현재 15품종)

품종명	개발 연도	출수기 (월.일.)	수량성(kg/10a)		적응지역	주요 특성
			생체	건물		
영 양	2002	05.01.	3,746	1,169	충남 이남	일반망, 다수성
선 우	2002	05.02.	3,611	1,104	전국(산간제외)	일반망, 다수성
상 원	2004	04.28.	3,556	1,184	전국(산간제외)	일반망, 다수성
우 호	2005	04.29.	3,610	1,096	충남 이남	매끈망, 기호성 향상
유 연	2006	04.27.	3,351	1,080	충남 이남	삼차망, 기호성 향상
소 만	2006	04.23.	3,169	1,060	중부 이모작 지대	중부 논 적응 조숙성, 일반망
다 미	2007	04.30.	3,286	1,199	수원 이남	잎 함량 많음, 무엽이, 혼파용
영 한	2008	04.26.	3,340	1,200	중부 이모작 지대	중부 논 적응 조숙성, 일반망
유 호	2008	04.24.	3,092	1,160	충남 이남	‘유연’의 탈립성을 개선, 삼차망
조 미	2010	04.23.	2,798	1,033	수원 이남	잎 함량 많음, 무엽이, 혼파용
유 한	2012	04.28.	2,769	1,261	중산간지 제외 전국	탈립성 개선, 삼차망, 후기 녹색성
녹 양	2012	05.06.	2,576	1,170	중산간지 제외 전국	품질 향상
무 한	2013	05.04.	3,175	1,238	중산간지 제외 전국	기호성 향상, 삼차망
미 호	2014	04.27.	3,003	1,225	중산간지 제외 전국	기호성 향상, 다수성, 반매끈망
다 청	2015	04.25.	3,087	1,208	중산간지 제외 전국	내한성 강, 일반망, 사일리지 품질 우수

| 조사료생산시스템과 | 041-580-6741