

24. 한우에서 내·외부 기생충 구충 요령은?

소에서 기생충은 장기 내부에 기생하는 내부기생충과 가축의 체표 외부에 기생하는 외부기생충으로 나눌 수 있습니다.

이중 내부기생충에서는 회충, 편충, 요충, 장결정충 등의 연충류가 외부 기생충에서는 모기, 이, 벼룩 같은 곤충류와 진드기 같은 거미류가 있습니다.

소가 기생충에 감염되면 성장, 면역 저하와 사료 효율 저하를 초래 할 수 있으므로 예방적 차원의 정기적인 구충이 필요합니다.

기생충 구제를 위해서는 우군 전체에 광범위한 구충을 정기적으로 실시해야 하며, 방목 시 진드기 예방을 위해 약제를 살포하는 것도 도움이 됩니다.

송아지의 경우 생후 1개월 이내, 외부 구입우의 경우 구입 후 1주일 이내 광범위 구충제를 먹이거나 주사 또는 피부에 뿌려 구충을 실시하여야 합니다.

일반적으로 내부 구충을 위해서 알벤다졸 등을 내외부 구충을 위해서는 이보맥 제제 등을 등에 뿌리거나 먹이는 방식으로 투여합니다. 특히 구충제의 각 성분별로 구제할 수 있는 기생충의 범위와 투여 방법, 투여 시 유의사항이 다르므로 제품설명서를 참고하여 올바르게 사용해야 합니다.

(가축질병방역과 / 063-238-7233)