24. 한우에서 내·외부 기생충 구충 요령은?

소에서 기생충은 장기 내부에 기생하는 내부기생충과 가축의 체표 외부에 기생하는 외부기생충으로 나눌 수 있다.

이중 내부기생충에서는 회충, 편충, 요충, 장결정충 등의 연충류가 외부 기생충에서는 모기, 이, 벼룩 같은 곤충류와 진드기 같은 거미류가 있다.

소가 기생충에 감염되면 성장, 면역 저하와 사료 효율 저하를 초래할 수 있으므로 예방적 차원의 정기적인 구충이 필요하다.

기생충 구제를 위해서는 우군 전체에 광범위한 구충을 정기적으로 실시해야 하며, 방목 시 진드기 예방을 위해 약제를 살포하는 것도 도움이 된다.

송아지의 경우 생후 1개월 이내, 외부 구입우의 경우 구입 후 1주일 이내 광범위 구충제를 먹이거나 주사 또는 피부에 뿌려 구충을 실시하는 것을 추천한다.

일반적으로 사용되는 구충제 성분으로는 알벤다졸, 이버멕틴 등이 있으며 등에 뿌리거나 먹이는 방식으로 투여한다. 특히 구충제의 각 성분별로 구제할 수 있는 기생충의 범위와 투여 방법, 투여 시 유의사항이 다르므로 제품설명서를 참고하여 올바르게 사용해야 한다.

(가축질병방역과 / 063-238-7223)