


10. 모돈의 체평점(BCS : Body Condition Score) 관리와 실시 요령에 대하여 알고 싶습니다.

▣ 모돈 체평점 실시 요령

체평점에 의한 개체관리는 차기 분만성적 저하를 방지하는 사양기술로서 체평점 판정 기준은 모돈 엉치부위 관골돌기의 지방 축적 상태를 손으로 만져서 비만도를 판정합니다. 번식모돈이 분만에 입식될 때 체평점을 실시하고, 분만 후 약 4~5일경 다시 점검한 다음 2일 간격으로 이유 시까지 실시하되, 임신기간 중에는 1주일에 1회 정도가 바람직합니다.

▣ 모돈의 체형점수 측정과 체형점수에 따른 상태



체형점수	상태	요각의 축진	등지방두께
5	과비	손으로 관골돌기를 찾지 못함	25mm 이상
4	살찌 있음	손으로 관골돌기를 찾지 못함	21mm
3.5	약간 살찌 있음	관골돌기를 찾기 어려움	-
3	이상적	관골돌기를 손으로 쉽게 찾을 수 있음	18mm
2.5	약간 마름	관골돌기가 축진되고 눈으로 볼 수 있음	-
2	너무 마름	너무 야위고 관골돌기를 눈으로 쉽게 볼 수 있음	10~15mm
1	심각하게 마름	체중 손실이 심각하여 매우 마른 상태	10mm 이하

* 출처 : 양돈과 영양-김유용, 2011

▣ 체평점에 의한 사료 급여 요령

이유 시에는 기준 평점인 2.5점을 목표로 사료 급여량을 적절히 증감해 주고, 임신 후기 직전인 임신 90일령에는 체평점이 3.0점이 되도록 이유 시 체평점 점수에 따라 사료를 증감해 줍니다. 갑작스러운 사료의 변경은 내분비 호르몬 균형이 깨질 염려가 있으므로 1차 조정 시 0.5kg씩 서서히 증감토록 합니다.

【 양돈과 】