



11. 포유모돈의 관리 포인트는 무엇이며, 번식모돈의 도태 기준은?

■ 포유모돈의 관리와 점검 포인트

- ① 체지방 1% 감소는 다음 번식 시 산자수를 0.1두 감소시킵니다.
- ② 비유기간 중 1일 6kg 이상의 사료를 급여하면 모돈 체형유지가 가능합니다.
- ③ 일반적으로 기초사료 2kg+자돈 1두에 각각 0.4kg을 추가 급여하는 방법을 적용합니다.
- ④ 사료 섭취량은 환경 온도의 영향이 매우 크므로 고온기에는 1일 4회 이상 나누어 급여합니다.
- ⑤ 분만돈 및 자돈의 사료 섭취량을 철저히 기록합니다.

■ 번식모돈의 도태 기준

- ① 산차 평균에 비해 이유 두수가 적고, 이전 산차에서도 이유 두수가 평균 이하인 모돈
- ② 분만 시 이상 산자수가 많은 모돈 : 6산 이후에서는 사산 두수가 증가하며, 생존 산자수를 중요하게 판단
- ③ 2산 연속 생시복당 총체중이 15kg 이하이고 생시체중 1kg 이하의 자돈이 20% 이상인 모돈
- ④ 1산차에서 2회 이상 재발하는 모돈과 LH-RH 유사물질을 투여해도 수태가 되지 않은 모돈
- ⑤ 발정 주기가 18~23일을 벗어나는 모돈과 6산 이상에서 재발하는 모돈
- ⑥ 무발정의 발생 빈도가 높고 이유 후 발정재귀가 지연되며 호르몬을 처리해도 개선되지 않은 모돈
- ⑦ 분만이 없거나 비생산일수가 긴 모돈 등은 양돈장의 생산성을 저하시키는 요인이므로 능력이 우수한 모돈으로 교체

【 양돈과 】